

ИДЕЯТА ЗА НАРЦИСТИЧНАТА РАНА ПРИ ПАЦИЕНТИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ И ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАН

Крумова-Пешева, Р., Спасов, Л., Михайлова В.

Университетска болница „Лозенец“, София

РЕЗЮМЕ

Усещането за витална застрашеност, идваща „отвътре“, от собственото тяло, е психичен феномен, свързан с чувството на загуба и разпад. Под въпрос е физическото и психическо функциониране и съхранение на пациента. Заплахата се усеща на различни равнища – соматично и емоционално. Провокира постоянно активизирана тревожност с особено висок интензитет. Провалите в репродуктивната способност са свързани с друг вид преживяване на загуба – в голяма степен тежко и драматично.

Авторите споделят своя опит като показват сходствата и различията в преживяването на загуба и нарцистична рана при две групи пациенти – с трансплантация на орган и с репродуктивни проблеми. Страхът за живота и страхът за продължаването на живота като различни страхове определят специфичните различия в емоционалната динамика на пациентите. Психичната преработка на травматизма преминава през сложни емоционални процеси и изисква много време и психотерапевтична работа.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: трансплантация, репродуктивни проблеми

ВЪВЕДЕНИЕ

Усещането за витална застрашеност, идваща „отвътре“, от собственото тяло, е психичен феномен, свързан с чувството на загуба и разпад. Под въпрос е физическото и психическо функциониране и съхранение на пациента. Заплахата се усеща на различни равнища – соматично и емоционално. Провокира постоянно активизирана тревожност с особено висок интензитет. Провалите в репродуктивната способност са свързани с друг вид преживяване на загуба – в голяма степен тежко и драматично.

Психологическата и психотерапевтична работа с пациенти, очакващи чернодробна и бъбречна трансплантация и с пациенти, очакващи процедури „ин витро“, показва редица сходни характеристики, свързани с чувството за травма и нарцистична рана. Психотерапията се провежда във всички етапи на медицинските процедури. Обхваща предтрансплантационния и следтрансплантационен период при едните и периодите преди и след процедурите „ин витро“ при другите.